

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

CHOLERA.



DISPUTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,

DE

CHOLERA:

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu, et

Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subicit

ROBERTUS WILSON, A. M.

CAROLINENSIS MERIDIONALIS,

SOCIET. REG. PHYS. EDIN. SOC. HON. ET PRÆS. ANN.

SOCIET. MED. EDIN. SOC.

SOCIET. AMER. PHYS. EDIN. SOC. EXTR. ET PRÆS. ANN.

---

“ PAL.—*Quid tibi est?* CAP. *Lien necat, renes dolent,*

“ *Pulmones distrahuntur, cruciatur jecur,*

“ *Radices cordis pereunt, hira omnes dolent.*

“ PAL. *Tum te igitur morbus agit hepaticus.*”

M. ACC. PLAUT. *Curcul.*

---

Ad diem 12. Septembris, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBAT ADAMUS NEILL CUM SOCIIS.



CAROLO COTESWORTH PINCKNEY,

JURIS ET ÆQUI

QUAM PERITISSIMO,

LITERISQUE HUMANIORIBUS

INSIGNITER ORNATO ;

OB

BENEVOLENTIAM

PATRIÆQUE AMOREM,

OMNIBUS BONIS

GRATISSIMO ACCEPTISSIMOQUE ;

HANC DISPUTATIONEM

D. D. DQUE

ROBERTUS WILSON.

JOANNI SIMPSON,

MERCATORI LONDINIENSI,

VIRO INTEGERRIMO

OMNIBUSQUE CONSPICUO VIRTUTIBUS ;

OB

PLURIMA ACCEPTA BENEFICIA,

PERTENUE HOC

GRATI ANIMI

SIGNUM

OFFERT

ROBERTUS WILSON.

ALEXANDRO WOOD,

EDINBURGENO;

INSIGNI CHIRURGIÆ SCIENTIA

PRÆCLARISSIMO;

PER EXIGUUM HOC

ANIMI

MAXIMIS BENEFICII VINCULIS

OBSTRICTI

TESTIMONIUM

PALAM

TRIBUIT

ROBERTUS WILSON.

## CORRIGENDA.

§ XVI. 2. *lin.* 9. *pro* reperiri *lege* reperiri

§ XXVI. *lin.* 4. *pro* colore *lege* calore

§ XLII. 2. *lin.* 7. *pro* confimiles, *lege* confimiles dejiciunt,

§ XLIII. 3. *lin.* 8. *pro* gangrenâ *lege* gangrænâ



# DISPUTATIO MEDICA

## INAUGURALIS

DE

# CHOLERA.

---

§ I. **D**E sævo et periculoso scripturus sum morbo, cujus magna sævitia plurimi hominum generis, in calidis potissimum regionibus, quotannis perimuntur. Rem satis, præ magnitudine, dilucidè tractare ut valeant humeri, admodum timeo. Cùm autem, quid sit verum, proferendi magis studiosus sim, quàm per incognita juveniliter ruere audax,

mecum primum conamen aggremente aderit, ut spero, vocatus APOLLO.

II. Hic loci, quibus in regionibus potissimum sæviat cholera ; quo anni tempore, et qua ætate impetus faciat ; cuinam corporis temperamento et habitudini infit maxima in eam proclivitas ; cuinam hominum ordini potissimum incidat ; quàm paucissimis priùs dicendum est, quàm ad majora pergamus.

III. *Regio.*—I. Quibus in regionibus maximè sævit cholera, eæ sunt calidæ. In utraque enim INDIA, atque in iis quidem ASIÆ, AFRICÆ, EUROPÆ et AMERICÆ partibus, quæ utrinque metis solstitialibus, et adhuc magis circulo æquinoctiali, adjacent, incolarum multos quotannis afficit, neque rarè improvifam iis atque inopinatam mortem affert.

2. Verùm enimvero non in eos, qui calidissima loca habitant, solos a cholera fævitur. Quibus enim regionibus est calor remissior, earum etiam incolas haud rarò laceffit; neque ii profectò, qui vitam ibi agunt, ubi, præ frigore, terra frugibus infœcundior est, ab ejus impetu semper immunes sunt.

IV. *Anni tempus.*—Eo anni tempore impetus potissimùm facit cholera, quo maximè caletur. In BRITANNIA, ut certiores nos facit SYDENHAMUS, auctor verbis interdum incomptus et quidem horridulus, sed veri semper pertinax, “eam anni partem, quæ æstatem fu-  
“ gientem, atque autumnum imminentem,  
“ complectitur, unicè ac eadem prorsus fide,  
“ qua veris primordia hirundines, aut infe-  
“ quentis tempestatis fervorem cuculus, amare  
“ consuevit (a):” atque profectò, ubique ter-  
rarum

(a) Vid. SYDENHAM. *Oper. Omn.* edit. LUGDUN. BATAV. 8vo. ann. M, DCC, XXVI. p. 175.

rarum orbis, eo invadere tempore incipit, quo maximus urget calor.

V. *Aetas*.—Omni ætate homines, si iis infit proclivitas, et si causis simul excitantibus obijciantur, in choleram incidant. Qui autem ætate sunt mobiles, præ cæteris, et irritabiles, ii huic fortasse morbo in primis patent. Quocirca infantes potissimum afficit et juniores, qui utique iis, quæ incitant, viribus facile raptimque moventur. In nonnullis profectò AMERICÆ SEPTENTRIONALIS regionibus, tanta infantibus inest in choleram proclivitas, ut gravissimè in eos quotannis sæviat, et a RUSHIO fit, neque profectò ineptè, *cholera infantum* appellata (b).

#### VI. Corporis

(b) Vid. RUSH. *Medical Inquiries and Observations*, edit. PHILADELPH. ann. M,DCC,LXXXIX.

VI. *Corporis temperamentum.* — Homines, qualicunque sint corporis temperamento, huic interdum morbo obnoxii sunt, causis excitantibus si sint objecti. Teste autem CHALMERO, eos, præ cæteris, adoritur, in quorum ventriculis ingenerari solet nimius acor (*c*). Hujusmodi enim hominibus, ut idem censet auctor, languescit non ventriculus solum, sed etiam, per totam longitudinem, intestina; et, insuper, organa, quorum est aliquid ex sanguine irrequieto secernere, haud parùm laxantur. Quibus est talis corporis habitudo, ii cholerae imprimis opportuni sunt (*d*).

VII. *Hominum ordo.* — In choleram imprimis incidunt splendidi et opulenti; quippe quorum corpora, præ ignavia et laxitate, ni-

mis

(*c*) Vid. LIONEL. CHALMER. *Account of the weather and diseases of SOUTH CAROLINA.* edit. LONDON. ann. M,DCC,LXXVI. vol. I. p. 200.

(*d*) Vid. CHALMER. *ibid.*

mis irritabilia, viribus quibuscumque incitantibus facile afficiantur.

### D E F I N I T I O.

VIII. Morbus, de quo disputatur, a CULLENO his verbis luculenter definitur :

“ Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul  
 “ dejectio frequens ; anxietas ; tormina ; fu-  
 “ rarum spasmodica. (e).”

### ENARRATIO SIGNORUM.

IX. 1. In propinquo esse choleram, prænunciant aliquando ructus ; dolores ventriculi et  
 intestinorum

(e) Vid. CULLEN. *Synop. Nosolog. Method.* tom. II.  
 Gen. LX.

intestinatorum acres et pungentes ; *cardialgia* et  
anxietas (*f*)

2. Verùm plerumque, nullis hujusmodi signis præeuntibus, inopinantes homines subito (*g*), et, ex adverso simul et a tergo, quasi ex infidiis invadit ; neque rarò, brevi quidem tempore, occidit.

X. 1. Cholera de improvise (IX. 2.) invadente, ventriculus, quæ contineat, ea rejicit ; et simul, mirum in modum, fluit alvus. Quæ initio sursum et deorsum ejiciuntur, iis insunt reliquiæ cibi (*b*), insignis acrimonia, et color  
plùs

(*f*) Vid. TUCKER. HARRIS. Tentam. Inaug. *De Cholera Spontanea*, EDIN. ann. M,DCC,LXXI.

p. 4.

Necnon JOANN. LEMAN. Disput. Inaug. *De Cholera*, EDIN. ann. M,DCC,LXXVIII. p. 11.

(*g*) Vid. HARRIS. et LEMAN. *ibid.*

(*b*) Vid. HARRIS. Tentam. *suprà* citat. p. 4.

plùs minùsve viridis (*i*). Haud multò autem pòst eveniunt flava, quæ vel omnino, vel saltem maxima ex parte, bile constant.

2. Quæ autem suprà infràque erumpit bilis, ei ab initio non est flavus color. Ut enim certiores nos facit CELSUS, est “ primùm aquæ  
 “ fimilis, deinde ut in ea recens caro lota esse  
 “ videatur, interdum alba, nonnunquam ni-  
 “ gra, vel varia (*k*).”

XI. Præter ea (X.), inflatio est, et intestina torquentur (*l*): æger dolore, quasi e ventriculi erosione, affligitur; admodum fitit; et  
 frigidus,

(*i*) Vid. CHALMER. oper. sup. citat. vol. I. p. 201.

(*k*) Vid. CELS. *De Medicin.* lib. iv. cap. xi. edit.

*Almeloveenian.* LUGD. BAT. ann. M,DCC,XLVI.

(*l*) Vid. CELS. *ibid.*



frigidos, præ cæteris, potus petiffit (*m*): arteriæ initio celeriter plerumque et frequenter, dum simul exæstuat anxius æger, moventur; non rarò etiam, sub finem, creberrimè, imbecilliter et inæqualiter: æger, insuper, perquam nauseat, et sudore gelido perma-  
det (*n*): crura, porrò, et brachia contrahuntur: animus deficit: extrema frigescunt: digiti incurvantur: vertigo (*o*) fit.

XII. Præter ea verò, quæ suprà (X.—XI.) comprehensa sunt, mirum in modum labant vires: cor palpitat: æger admodum inquietatur

(*m*) Vid. LEMAN. Disput. sup. citat. p. 11.

(*n*) Vid. ARET. CAPPAD. *De caus. et sig. acut. morb.*  
edit. OXON. M,DCC,XXIII. lib. ii. cap. v.

Vid. SYDENHAM. oper. p. 175.

(*o*) Vid. ARET. CAPPADOC. *De caus. et sig. acut. morb.* lib. ii. cap. v.

Vid. quoque CELS. *ibid.* et SYDENHAM. *ibid.*

tatur, et membra huc illuc affiduè jaçtat; totas noctes pervigilat; fingultit; urinæ nihil reddit; et toto corpore convellitur (*p*): vox intercidit (*q*): cadaverosa denique fit facies, et livescit (*r*).

XIII. Hæc (X.—XI.—XII.) signa, aliaque his consimilia, quæ astantes magno timore perfundunt, brevi spatio, tertio plerumque die, rariùs quarto (*s*), interdum viginti quatuor ferme horis, ægro mortem afferunt. Si quando, id profectò quod rarissimè accidit, ultra septimum diem perducatur cholera, de propria forma semper degenerat (*t*).

## XIV.

(*p*) Vid. HARRIS. Tentam. sup. citat. p. 5.

(*q*) Vid. ARET. CAPPAD. loc. modò citat.

(*r*) Vid. LEMAN. Disput. sup. citat. p. 11.—12.

(*s*) Vid. LEMAN. ibid.

(*t*) Vid. LEMAN. ibid.

XIV. His (X.—XI.—XII.—XIII.) de cholera generaliter dictis, hic loci non a re erit, de *cholera infantum* specialiter et productius differere, priusquam ad cætera disputamus.

XV.—1. Cholera infantum interdum a diarrhœa incipit; quæ, complures per dies, prospera interim cæteroquin valetudine, perstat: sed sæpius a vomitu et purgatione gravibus, atque ardente simul febre (*u*).

2. Quæ suprâ infrâque erumpunt, flava plerumque ea vel viridia sunt: verùm deji-  
ciuntur nonnunquam mucosa et sanguinea quædam, quibus inest ne minimum quidem bilis. Quinetiam limpida interdum, haud secus atque ipsa aqua, sunt ea, quæ sursum deorsumque eveniunt (*x*).

3.

(*u*) Vid. RUSH. Opusc. sup. citat. p. 112.

(*x*) Vid. RUSH. Opusc. p. 112.—113.

3. Quali acunque dejiciuntur, cum iis sæpe numero eliminantur vermes. Cùm eò usque a morbo processum fuerit, infantes multùm dolere videntur. Pedes attrahunt; neque eodem aliquantisper situ semet habere possunt ( $\gamma$ ).

4. Arteriæ celeriter, imbecilliterque micant. Caput, præter solitum, calet; dum, interea, extrema nihilo plùs calent, aut aliquantùm etiam frigescent ( $\alpha$ ).

5. Quæ adest febris, ea ad *intermittentium* genus pertinet, et manifestè, imprimis vesperscente die, ingravescit ( $a$ ).

6. Eò usque interdum capite turbatur, ut ægroti non solùm delirent, sed etiam insaniant;

( $\gamma$ ) Vid. RUSH. opusc. sup. citat. p. 113.

( $\alpha$ ) Vid. RUSH. opusc. ibid.

( $a$ ) Vid. RUSH. opusc. ibid.

ant; adeo profecto, ut annuant viciffimque renuant, et matres aut nutrices modò unguiculis laceffere, modò morfiunculis, aggrediantur (*b*).

7. Intumefcit ferme non folùm abdomen, fed etiam facies et membra. Languefcunt oculi, et in orbitas quafi recessiffe videntur. Semiapertis plerumque oculis ægroti dormiunt; neque rarò ufque eò parùm fenfile redditur corpus, ut ipfi oculi aciei mufcæ, palpebris interea, quò has aufugiant, nihilo magis in motum concitatis, infidere confpiciantur (*c*).

8. Per totum interdum morbum, ægroti continenter ferme vomunt, alvo interea non profluente; sæpius autem multo fluit alvus, vomitione interea nullâ. Quæ dejiciuntur,  
ea

(*b*) Vid. RUSH. opusc. ibid.

(*c*) Vid. RUSH. opusc. ibid.

ea magnâ plerumque copiâ sunt, et foetent admodum; sunt verò interdum foetoris expertiâ, atque potum et cibum, quos adhibuerint ægri, referunt (*d*).

9. Paucis nonnunquam diebus, mortem affert hic morbus. Viginti quatuor circiter horis, morte infantem afficere semel vidit RUSHIUS. Sed certiores nos facit præclarus hic auctor, fugaciorem esse vel longinquiorem, pro anni tempestate et cœli temperie. Frigidulus enim dies vim ejus minuit haud rarò, efficitque ut prosperè finiatur (*e*).

10. Verùm etiamfi cholera infantum brevi admodum (XV.—9.) cursu nonnunquam finiatur; tamen, testante RUSHIO, sæpe, signis deinceps aliquantùm varia, in sex hebdomadas,

(*d*) Vid. RUSH. opusc. ibid.

(*e*) Vid. RUSH. opusc. ibid.

das, imo in duos interdum menses, produci-  
tur (*f*).

11. Siquando ita (XV.—10.) protracta,  
cholera fit lethaliter evasura, mors lento gra-  
du accedit, ejusque impetum exitiosum obla-  
ta ex longinquo multa signa infesta prænun-  
ciant. Adeo emacrescit corpus, ut ossa, cute  
perruptâ, in conspectum veniant: livescit æ-  
ger hîc illic; singultat; convellitur: cadave-  
rosa admodum fit facies: et os internum ex-  
ulceratur. Cùm eò usque processum fit, ra-  
rissimè profectò infantes servantur (*g*).

## SEDES.

XVI.—1. Ex notis, quibus insignitur cho-  
lera, satis constat, intestino canali toti inside-  
re.

(*f*) Vid. RUSH. opusc. ibid.

(*g*) Vid. RUSH. opusc. p. 114.

re. Incisis autem cādaveribus, affecta, præ cæteris partibus, conspiciuntur ventriculus et *duodenum*; utpote quæ gangrænâ fœdata exploranti *anatomico* semet offerant (*b*). CELsus de sede hujus morbi loquens, hisce verbis utitur: “ hic quidem morbus et acutus est, et “ inter intestina stomachumque versatur sic, “ ut, cujus potissimum partis fit, non facile “ dici possit (*i*).”

2. Ultra autem has (XVI.—I.) partes, patet hic morbus. Malè enim afficiuntur et vesica, quæ continetur bilis, et ductus, quo in *duodenum* rectâ viâ profluit; neque rarò hic adeo ampliatur, ut digitum auricularem intromittat. Alia simul signa adfunt, quæ redundare

(*b*) Vid. HOFFMAN. *oper. omn.* edit. GENEV. ann. M,DCC,LXI, tom. iii. sect. ii. cap. viii. § viii. et ix.

(*i*) Vid. CELS. *De Medicin.* lib. iv. cap. xi.



clundare bilem indicant (*k*). Huc accedat, quòd certiores nos facit BONETUS, ipsum jecur aridum et exfuccum reperiri (*l*).

XVII. His (IX.—XVI.) de notis quibus insignitur cholera, et de ejusdem sede comprehensè dictis, nunc de causis, quibus efficiatur, quàm brevissimè differendum est.

## DE CAUSIS.

XVIII. Causæ, ex quibus originem ducât cholera, duo in genera possunt dividi; quorum unum causas ejus *remotiores* complectitur, alterum *proximam*.

C

DE

(*k*) Vid. BONET. *Sepulchret.* edit. GENEV. ann. M,DC,LXXIX, tom. ii. lib. iii. sect. ix. observat. ii.

(*l*) Vid. BONET. *Sepulchret.* ibid.

## DE CAUSIS REMOTIORIBUS.

XIX. Ex causis hujus generis nonnullæ tantummodo opportunum ad choleram corpus faciunt; nonnullæ, in corpore jam opportuno factò, hanc excitant. Quapropter, *prædisponentes* appellantur illæ causæ; hæ autem *excitantes*. De utraque specie perpauca dicenda sunt.

XX.—I. *Causa prædisponens*.—In choleram proclivitas in laxitate musculofarum totius corporis, præcipuè autem intestinorum, fibrarum est, nobis opinantibus, ponenda. Hic enim morbus juniores, imprimis pueros (*m*), atque otiosos quibus sunt corpora resolutiora, quàm provectiores ætate (*n*), et laboriosos quibus firmiora, multò sæpius afficit.

2.

(*m*) Vid. ARET. CAPPAD. *De Caus. et Sig. Acut. Morb.* lib. ii. cap. v.

(*n*) Ibid.

2. Quinetiam, in calidissimis regionibus, et dum sitientes agros torreat Sirius, graviter ab eo fævitur; dum in frigidioribus orbis terrarum locis, et remissioribus tempestatibus, infestos ferme nunquam, vel faltem rarissimè, homines habet (o).

3. Præterea, ex hac (XX.—1.) corporis resolutione, magna ex parte, imo prorsus ferme, pendet nimia ea intestinorum irritabilitas, quæ, ut infrà (XXVIII.—XXX.) aggrediemur probare, *proxima* cholerae causa videtur.

XXI. *Causæ excitantes.*—Quibus concitatur causis morbus, de quo hic disputatur, eæ minimè semper manifestæ sunt. In proclivibus enim morbum efficiant causæ etiam levissimæ, qualesque vix, et profectò sæpenumero ne vix quidem,

(o) Vid. ARET. CAPPAD. ibid.

quidem, evidentes sint ipsi ægroto, nedum medico.

XXII. In iis autem, quibus nondum tanta inest in morbum proclivitas, evidentiores quædam sunt causæ, quæ hunc concitare observantur. Hæ quænam sint, nobis, hîc loci, compressè dicendum est.

XXIII. Evidentiorum (XXII.) causarum, quæ choleram concitant, aliæ ipsi ventriculo et intestinis, aliæ externo corpori, admoventur.

XXIV. Primi (XXIII.) generis sunt in primis venena, arsenicum, velut, et hydrargyrus *muriatus* (*p*): cathartica et vomitoria acriora, *esula*, putà, et *vitrum antimonii*, intemperantiùs et incommodiùs propinata (*q*):  
alimenta

(*p*) Vid. HOFFMAN. oper. omn. tom. iii. sect. ii. cap. viii. § xi.

(*q*) Vid. HOFFMAN. ibid. § xii.

alimenta concoctu difficilia (*r*); vel ex fermentefcentibus, pinguibus, aut dulcibus confecta (*s*): fructus, cucumeres, nimirum, *melones*, pepones, mala Perfica, pruna, uvæ, cerasa (*t*); præcipuè autem fructus immaturi (*u*); et hinc, aliqua faltem ex parte, reddi poteft ratio, quare eo potiffimùm anni tempore invadat cholera, quo abundant fructus, quos, etiamnum crudos neque coctos, homines, præ torrente æftu, fitientes cupienter comedunt.

XXV. Ex caufis fecundi (XXIII.) generis, præcipuæ funt frigus et humor corpori calefacto

(*r*) Vid. SANDERIS. *Treatife on the Structure, Economy, and Difeaſes of the Liver*, edit. LOND. ann. M,DCC,XCIII, p. 142.

(*s*) Vid HOFFMAN. oper. ibid. § xiii.

(*t*) Vid. HOFFMAN. ibid.

(*u*) Vid. SANDERIS. opufc. ſup. citat. p. 142.

lefacto admota. Hæc plurimum ad choleram concitandam pollere, fatis eo constat; quòd, vel calidissimo anni tempore, rarò intestina corripit hic morbus, nisi postquam graves imbres cœlum humidum reddiderint, et, vaporationi locum dando, corpora hominum calore priùs laxata magnopere refrigeraverint.

XXVI.—I. Quo modo frigus (XXV.) choleram efficiat, explicari, aliqua saltem ex parte, potest. Humor enim frigidus externo corpori, imprimis diutino colore plurimum laxato, admotus, exhalationem cutis reprimat; acriæque admodum forsan ea, quæ per cutis spiramenta debent corpore excerni, interiora versus, potissimum canalim alimentarium et portæ venam, repellit.

2. Ob hunc (XXVI.—I.) repulsum, intestina insolito stimulo irritata, in motus enor-

mes concitantur. Ventriculus ideo, graviter vomendo, contenta sursum rejicit; simulque intestina fœdissimâ proluvie continenter ferme vexantur et exinaniuntur. Quæ ipso initio suprâ infrâque erumpunt, ea profectò naturalia plerumque sunt; sed, haud multò pòst, proprio colore amisso, bile decolorantur, quam ductus, quibus fluit hic liquor, incitato intestinorum motu quasi emulsi, in *duodenum* suffundunt.

3. Solicitatis (XXVI.—2.) ductibus, quibus fluit, fel solito uberius fecernitur; et, ut alia secreta, mucus, nimirum, et lachrymæ, quo uberior est, eo fortasse acrior. Veri quidem simillimum est, ut opinatur SANDERISIUS, gravis utique auctor, bilem non probè fecerni, sed naturâ inter bilem naturalem et sanguinem intermediâ esse. Fortasse enim, ut eisdem auctori videtur, ob incitatum sanguinis motum, globuli plurimi rubri nihildum mutati

tati ex capillaceis arteriis impelluntur in *poros*, quibus fluit bilis ; et cum felle commisti, per ductum hepaticum, in *duodenum* profluunt (*x*). Si reipfa ita fit, minimè profectò mirum est, si, dum urget cholera, bilis, eodem quo redundat tempore, fit solito acrior, ideoque intestina nimio opere incitet.

4. Præ insolita (XXVI.—3.) copia acrioris forsitan bilis, intestina adhuc magis enormiter et perturbatè commoventur ; concitatissimique eorum motus, ut fecernatur bilis adhuc copiosior et acrior, vicissim efficiunt. Hoc modo intestina, in motus vehementes concitata, bilis et vim et acritudinem, præter solitum, augent ; et insolita bilis vis et acritudo vicissim concitant intestina ; neque rarò, hanc ob rem, eò sævitiae brevi quidem tempore procedit morbus, ut, nisi ei opportunè

(*x*) Vid. SANDERIS. opusc. sup. citat. p. 143.



tunè obfistatur, vires ægri prorfus exhauriat, eumque interimat.

XXVII. Causis, quæ choleram concitent, iram vehementiorem annumerat HOFFMANUS (*y*); et profecîdò a medicis enarrantur exempla, ex quibus, homines irâ excandefcentes in lethalem choleram reapse incidiffe, constat (*z*). Idem, porrò, auctòr certiores nos facit, teneros infantes cholerâ, quam concitaverit lac matribus irâ graviter commotis exfuctum, sæpenumero perire (*a*).

D

DE

(*y*) Vid. HOFFMAN. Oper. tom. iii. ibid. § xiv.

(*z*) Vid. *Act. Med.* BEROL. vol. viii. p. 80.

PLATER. *Observ.* lib. iii. p. 754.

BORELL. *Cent.* ii. *Observ.* 27. p. 121.

(*a*) Vid. HOFFMAN. Oper. tom. iii. ibid.

## DE CAUSA PROXIMA.

XXVIII. De hac rei nostræ parte fusè differere, non opus est. Cùm enim ex causis (XXI.—XXVII.), quæ choleram concitant, tum ex curandi ratione, quæ, ut infrà (XLVI.—LI.) ostendemus, prosperrimè cedit, *proximam* ejus causam esse concitatissimos intestinorum motus, qui ex morbida pendent (XX. 3.) irritabilitate, fatis constat.

XXIX. Quod ad causas (XXVIII.) concitatrices attinet, animadvertendum est, earum plurimas, imo fortasse omnes, ventriculum et intestina, rectà vel minùs rectà, plùs minùsve afficere. Acrìa et concoctu difficilia, quibus, ut suprà (XXIV.) diximus, sæpenumero concitatur cholera, ipsi ventriculo intestinisque admoventur. Quin et, frigus et humor (XXV.), licèt externo admoveantur corpori,  
tamen

tamen, exhalatione cutis suppressâ, et repul-  
fis introrsum acribus quibusdam, quæ, per  
cutem, corpore excerni solent, morbosos ef-  
fectus in ventriculo potissimum et intestinis  
edunt.

XXX. Ratio, porrò, medendi, opinionem  
(XXVIII.) de causa cholerae proxima tradi-  
tam, adhuc verifimiliorem reddit; quippe  
cùm, concitatissimis intestinorum motibus fe-  
datis, morbus protinus solvatur.

### RATIO QUORUNDAM SIGNORUM.

XXXI. Singula hujus morbi signa nobis  
in animo non est speciatim exponere. Hoc  
enim si faceremus, nimis profectò longi vide-  
remur. Quocirca, signa carptim tantummo-  
do, prout dignissima quæque videantur, hìc loci  
explicabimus.

XXXII.

XXXII. *Liquoris biliosi vomitus*,—retroflexo *duodeni* motu flexuoso efficitur; quo in ventriculum bilis, præter naturam, influit, et, præ acrimonia, hunc in validissimas incitat contractiones, quibus semet exinanire continenter ferme aggrediatur.

XXXIII. *Diarrhœa biliosa*—est intestinis incitatiùs, propter magnam vim bilis, tum astringentibus se, tum relaxantibus tribuenda. Ob incitatioem enim astrictionem et relaxationem, non solùm reliquiæ cibi, et mucus quo illinuntur intestina, sed ipsa etiam bilis quæ suum illis colorem impertit, continenter ferè et solito uberiùs depelluntur.

XXXIV. *Sitis*,—qua arefcunt fauces eorum, qui cholera implicantur, initio fortasse bile in ventriculum infusa efficitur; postea verò, quàm aliquandiu sæviverit hic morbus, potiùs, ut præclaro GAUBIO videtur, miro  
fluidarum

fluidarum corporis partium dispendio, quod continuæ ferme exinanitiones fecerint.

XXXV. *Anxietas*—attribuenda, fortasse, est sanguini, ob spiritum imbecillum, per pulmones ægrè transmissio; vel, ut opinatus est GREGORIUS, pater, et quod profectò vero haud absimile est, in vena portæ cumulado.

XXXVI. *Torminum*,—quibus, urgente cholera, affligitur ægrotus, causa videtur vehemens intestinorum deorsum motus, cui, in locis quibusdam, remoramini est contractio spastica. Hac enim contractione motibus, ne deorsum propagentur, impeditis, intestina, quo in loco eorum motibus obstat, eo torquentur quasi et gravissimè dolent.

XXXVII. *Palpitatio cordis et singultus*,—quæ utraque, sub finem cholerae, superveniunt, et mali profectò ferme ominis sunt, fibræ musculosis,

mufculofis, præ exhausto propè jam corporis vigore, femet enormiter et raptim contrahentibus videntur effici.

XXXVIII. *Animi deliquium et furarum spasmi*,—quæ graviori cholerae supervenire solent, cordi debili et labanti tribuenda sunt. Vitale enim hoc organum labefactatum, fatis magnam sanguinis vim in cerebrum, et extrema membra, propellere nequit. Deficiente autem vitali hoc latice, non solum fatiscit cerebrum, atque labant vires, quæ, nisi ejus efficaciam continenter et fatis refocillentur, brevi prorsus extinguuntur; sed etiam extremæ corporis partes, quippe quibus, eam ob rem, vitalis et salutaris calor vi fatis magna minime evolvatur, frigore obrigent.

XXXIX.—I. *Sudor gelidus*,—cui inditum horridulâ sed eorum linguâ est nomen *colliquativus*, pendet ex furculis arteriarum exhalantibus,

tibus, quibus excernitur sudor, præ insigni debilitate laxatis, ideoque partes sanguinis, quales naturaliter non exsudantur, effundentibus.

2. *Frigus*—ex hoc sudore, quod sentit cum explorans medicus tum astantes amici, vaporante ex cute humore efficitur.

## DE DIAGNOSI.

XL. Morbi, quibus cum cholera intercedit ulla similitudo, sunt *diarrhœa* et *dysenteria*.

XLI. *Diarrhœa*—dignoscatur cholera dejectionibus, signis comitantibus, diuturnitate et periculo.

1. Quæ, urgente illo morbo, dejiciuntur, ea plerumque constant ex ingestis alimentis et naturali intestinorum muco; quæ autem, sæviente hoc, ea, ut plurimum, ex acriore bile. Verùm, licèt plerumque ita fit, nonnunquam tamen, cùm gravior urget diarrhœa, fæces bile commixtæ dejiciuntur. Hujusmodi diarrhœæ, quæ a CULLENO (*b*) et SAUVAGESIO *biliosa* haud ineptè appellatur, cum cholera magna est similitudo; quippe cùm hanc non modò dejectionibus biliosis referat, sed etiam eodem anni tempore et simili cœli constitutione homines afficiat. Internosci autem eo possunt hi morbi, quòd, ineunte ferme cholera, biliosæ plùs minùsve dejectiones conspiciuntur, sed non ita priùs in diarrhœa, quàm aliquandiu hæc persistiterit.

2. Quod

(*b*) Vid. CULLEN. *Synops. Nosolog. Method.* edit. quart. tom. ii. gen. lxi. 2.



2. Quod ad signa comitantia attinet, observandum est, cholera correptum nunquam ferme non vomitu affici; ferè autem nunquam, diarrhoea laborantem. Quinetiam, furarum spasmi, quibus, dum sævit ille morbus, ægrotus persæpe affligitur, hoc implicitum rarissime infelicitant.

3. Memoratu, porrò, dignum est, diarrhoeam cursum lentè absolvere; dum cholera conflictantibus plerumque, ut poetæ sublimis verbis utar,

—————“ *Cita mors venit, aut victoria læta (c).*”

4. Cholera, denique, periculosus admodum morbus est; nunquam ferme ita diarrhoea, ni siquando morbis quibusdam natura infanabilibus, aut saltem sanatu difficillimis, phthisi nimirum pulmonum, et hydropi, supervenerit.

XLII. *Dysenteria*—et cholera internoscantur causis excitantibus et proxima, dejectionibus, signis comitantibus, sede, diuturnitate et periculo.

I. A. Quæ dysenteriam concitat causa, ea est contagio specialis, subinde classibus et castris ingenerata, et ministeriis invicem vulgata, qualem autem verbis aptè definire nequimus. Choleram, contrà, nihil tale primùm concitat, aut postea vulgat concitatam.

B. Causa dysenteriae proxima, ex qua, intermedio nullo, signa enascuntur, est, ut MONRONI videtur, inflammata tunica intestinorum villosa, vel, ut CULLENO placet, spastica horum contractio; ea autem, ex qua propria cholerae signa, motus intestinorum, præter solitum, irritabilium perturbatus, mirum in modum, et concitatus.

2. Qui choleram nacti sunt, ii copiosa perquam et biliosa cum vomunt tum dejiciunt; parca autem admodum et mucosa vel sanguinolenta, imo sincerum sanguinem (*d*), quibus, porrò, insunt, tam membranulæ quasi mucosæ, quàm globuli fæcum indurati, et massulæ albidæ sevosis confimiles, qui dyfenteriam.

3. A. Huc accedat, quòd, ab ipso quidem initio, dyfenterici febricitant; dum, qui in choleram inciderunt, iis, ad finem usque, a febre ferme semper integritas est, ni sicubi intermittente (XV. 5.) implicati sint infantes.

B. Dyfenteria præterea, in primis autumnali, putrescunt, vel saltem quasi putrescere videntur, corporis humores; id profectò, quod cholera correptis nunquam, vel saltem ferè nunquam, accidit.

C. *Aphthæ*

(*d*) Vid. SYDENHAM. Oper. Univers. p. 180. et 601.

C. *Aphthæ* infuper, exeunte dyfenteria, oris interna, faucesque sæpenumero obfident (*e*); id quod in cholera nunquam, quantum fcio, evenit.

4. A. Ad hoc, in dyfenteria, in primis fi in longum trahatur, omnia deinceps inteflina, fuo quodque deorfum ordine, affici videntur; donec omnis morbi vis in imum inteflinum inferatur, et moleftiffimum tenefinum efficiat (*f*).

B. Cholera, licèt omnia itidem inteflina plùs afficiat minùsve, tamen, ut liquet ex introfpectis (XVI. 1.) cadaveribus, in ventriculum, præ cæteris, et duodenum sævit: neque profectò inteflina folà, et ventriculus, patiuntur; fed etiam, mirum interdum in modum, ut fuprà (XVI. 2.) diximus, et veficula qua continetur

(*e*) Vid. SYDENHAM. Oper. Univerf. p. 180. et 603.

(*f*) Vid. SYDENHAM. Oper. Univerf. p. 180.

tinetur fel, et ductus per quem in duodenum fluit.

5. Dyfenteria, porrò, eos inter morbos referenda est, qui longi appellantur; inter breves, contrà, cholera, “ qui citò vel tollunt hominem, vel ipsi citò finiuntur (*g*).”

6. Utroque utique morbo vita perfæpe vel extinguitur, vel in summum saltem discrimen perducitur. Verùm enim verò, hac de re, memoratu dignum est, dyfenteriam, quamvis, auctore SYDENHAMO, adultis, maximè grandævis, haud rarò exitialis fit, infantibus tamen perbenignam reperiri (*b*); dum, in AMERICA, ut certiores nos facit RUSHIUS, cholera, potissimùm si magno tempestatis calore vis ejus perquam intendatur, infantibus vixdum partis nedum bimulis summum sæpenu-

mero

(*g*) Vid. CELS. *De Medicin.* lib. iii. cap. i.

(*b*) Vid. SYDENHAM. *Oper. Univerf.* p. 180.

mero discrimen, imo citam haud rarò et præmaturam mortem, quotannis affert (*i*).

### PROGNOSIS.

XLIII. 1. De eventu hujus morbi, ex signorum gradu præjudicandum vel præfagiendum est. Si perquam dolent intestina et flatu distenduntur, et æger dolore, qualis ventriculo efficitur eroso, continuò angitur; malum est. Si fitit admodum, et frigidus tantummodo potus petiffit, malum iterum. Si, in eunte morbo, arteriæ quàm concitatissimè moventur, dum simul exæstuat anxius æger; vel si, sub finem, imbecilliter admodum et inæqualiter micant; malum quoque.

2. Pessimum est, si quando sudore gelido perfundatur æger; identidem animus deficiat;

(*i*) Vid. RUSH. Opusc. sup. citat.

ciat ; frigescant extrema membra ; aut, ægro incio vel nolente, crurum et brachiorum musculi contrahantur.

3. In lubrico versatur is, cui cor magno-  
pere palpitat ; qui perpetuò vigilat ; conti-  
nenter ferme singultit ; et urinam justo tem-  
pore reddere nequit. In propinquo est mors,  
cùm ægroto totum corpus convellitur, atque  
cadaverosa fit facies et livescit. Servari, de-  
mum, nequit is, qui sincerum sanguinem de-  
jicit ; quippe quia hinc apparet, gangrenâ  
insanabili jam esse, aliqua in parte, vitiata  
intestina.

XLIV. His de malis (XLIII.—1. 2. 3.) sig-  
nis cognitis, de iis, quæ prosperum exitum  
præcinunt, ubertim differere non opus est. Si  
enim illa vel non adfunt, vel, medicinâ tem-  
pestivè adhibitâ, promptè cedunt ; bonum  
est. Optimum quoque est, si viribus non-  
dum

dum admodum fractis, motus enormes intestinorum confopiantur, vel, his etiam vixdum confopitis, morbus veteraverit ; neque enim, rebus ita se habentibus, de ægroto desperandum est.

### RATIO MEDENDI.

XLV. Quò curetur cholera, opus est,

*Primò*, intestina eluere ;

*Deinde*, hoc factò, motus enormes confopire.

### DE INTESTINA ELUENDO.

XLVI. Ut humoribus irritantibus exonerentur intestina, cathartica devorare non opus est (*k*) ; cùm præsertim illi ipsi intestinorum motus concitent, quales ipsos expellere possint. Quinetiam, qui hujusmodi humores  
catharticis

(*k*) Vid. SYDENHAM. Oper. Univers. p. 176.



catharticis expellere conatur, is, ut certiores nos facit SYDENHAMUS, multiplice experientia edoctus, idem agit, atque is, qui ignem oleo extinguere fatagit; cum hujus generis medicamenta, vel lenissima, intestina magis perturbent, et novos insuper tumultus excitent (l).

XLVII. Cum ita fit, in hunc (XLVI.) finem; tantummodo necessarium est, diluentia parcâ haud manu adhibere (m); quippe cum et materiae nocivæ acrimoniam obtundant, et, ut illa ex intestinis faciliùs eliminetur, efficiant. Quapropter, ex diluentibus quænam anteferenda sint, quàm paucissimis, hîc loci, dicendum.

F

XLVIII.

(l) Vid. SYDENHAM. Oper. Univers. p. 176.

(m) Vid. ARET. CAPPADOC. *De caus. et sig. acut. morb.* lib. ii. cap. iv. sub. init.

Necnon SYDENHAM. et CULLEN. loc. modò citat.

XLVIII.—I. *Aqua tepida*,—ut testantur CELSUS (*n*) et ARETÆUS (*o*), commoda est; verùm subinde enimvero et parcè, ne in ventriculo fiant intentiones vacuæ, convulsioni similes, adhibenda (*p*).

2. *Aqua, in qua cocta est pullastra*,—ita ut devoranti carnis saporè vixdum sensiferum impertiat, itidem acres intestinorum humores quàm optimè diluit. Hujusmodi jusculi capaciores aliquot cyathos ut exhauriat æger, præcipiendum est. Eodem tempore proficiet plurimùm, idoneam ejusdem quantitatem, clysteris ope, per anum in intestina compluries immittere (*q*). Eidem, porrò, sive hausto, sive per anum immisso, SYDENHAMO mos erat lactucæ, violarum, porculacæ, aut nymphææ,  
 unciam

(*n*) Vid. CELS. *De Medicin.* lib. iv. cap. ii.

(*o*) Vid. ARET. CAPPAD. lib. ii. cap. iv.

( ) Vid. ARET. CAPPAD. *ibid.*

(*q*) Vid. SYDENHAM. *Oper. Univers.* p. 176.

unciam admiscere (*r*): hæc autem hodie, ex toto, exoleverunt.

3. *Aqua porrò cocta ex avenacea farina*,—ad obtundendam humorum acrimoniam, teste SANDERISIO (*s*), multùm pollet; neque profectò dubium est, quin, eundem in finem, ad aquam, qua coctum est hordeum, commodissimè decurri possit.

DE ENORMES INTESTINORUM MOTUS  
CONSOPIENDO.

XLIX. Acri materiâ elutâ, omnique intus diffusâ cruditate, intestina, si etiamnum graviter tumultuentur, quàm primùm consopienda sunt  
medicamentis,

(*r*) Vid. SYDENHAM. Oper. Univerf. ibid.

(*s*) Vid. SANDERIS. Opusc. sup. citat. p. 144.

medicamentis, ex iis quæ, irritabilitatem hebitando, eorum tumultum fedant (*t*).

L. I. *Missio sanguinis, exulceratoria et fomenta.*—In hunc (XLIX.) finem, si, ineunte morbo, qua febris et inflammatio adfint, utile erit, ut certiores nos facit SANDERISIUS, sanguinem, quantâ opus fit copiâ, elicere; et externo, insuper, abdomini emplastrum perampulum exulceratorium superimponere. Interdum, porrò, ut censet idem auctor, in balneum tepidum ire, ægrum commodo haud aspernando afficiet (*u*).

2. *Opium.*

(*t*) Vid. SYDENHAM. Oper. p. 177.

SANDERIS. Opusc. suprâ citat. p. 144.

CULLEN. *First Lines*, § M.CCCC.LXIII.

(*u*) Vid. SANDERIS. Opusc. sup. citat. p. 144.—5.

2. *Opium*.—Efficacissima autem, ad quæ hoc (XLIX.) consilio decurri potest, sunt medicamenta(x), quibus inest opium. Hæc, quantitate satis magnâ, parvâ autem mole, liquida assumenda sunt (y); et, in provento morbo, si jam admodum conciderint arteriæ, et extrema frigeant, aromata quædam adjicere plurimum proderit (z).

3. *Emollientiâ per anum immissa*.—A. Eodem tempore, ut scientes nos faciunt medici, jure magni nominis, CULLENUS (a), nimirum, SANDERISIUS (b), et GREGORIUS (c), commodissimum erit,

(x) Vid. SYDENHAM. Oper. Univerf. Ibid.

CULLEN. *First Lines*, Ibid.

(y) Vid. CULLEN. *First Lines*. Ibid.

(z) Vid. SANDERIS. Opusc. sup. citat. Ibid.

(a) Vid. CULLEN. *First Lines*. Ibid.

(b) Vid. SANDERIS. Opusc. sup. citat. Ibid.

(c) Aud. GREGOR. Secund. EDINBURGEN. prælect.

*De Cholera*, ann. M.DCC.XCIII-IV

erit, emollientia, quibus infit opium liquidum, clysteris ope in anum injicere.

B. Cholerâ laboranti plurimùm hoc proficere, ex propria experientia testari possum. Ad ægrum enim hoc morbo correptum accessitus, diluentibus primùm ubertim datis, opium liquidum, quò sedaretur intestinorum tumultus, curavi. Hoc verò, vixdum devoratum, irritabilis perquam ventriculus illico respuit. Periclitato compluries nequicquam eodem, quid proficere posset, tandem abstinui. Adeo jam ægroto considerant vires, ut, in propinquo esse mortem, mihi videretur. Priùs autem, quàm eum omnino deplorarem, præcepi, ut, per anum, usque ad quatuor ferme uncias, immitteretur amyllum, in quo opii liquidi quadraginta propè guttulæ inerant.

C. Hoc factò, illico ferè stiterunt alvus et vomitus, atque arteriæ semet inceperunt attollere. Paulò pòst, ægroto obrepfit optatus placidissimusque somnus. Aliquot post horas, ex gratissimis hujus amplexibus experrectus est, plurimùm fatus et refectus. Exinde, vires morbo fractas paulatim collegit, atque firma nunc fruitur valetudine.

LI. Sublato morbo, convalescenti vires curaturâ reficiendæ sunt; et sedulò vitanda, quæcunque corpus infirment, lassitudo in primis et frigora (*d*), donec pristinum jam vigorem receperit.

(*d*) Vid. CELS. *De Medicin.* lib. iv. cap. ii.

F I N I S.







